

Fiche informative :

LA COQUELUCHE

La coqueluche est une maladie infectieuse aiguë et contagieuse survenant surtout dans l'enfance. Devenue très rare grâce à la vaccination, elle est particulièrement sérieuse chez le nourrisson. 10 à 15% des coqueluches surviennent chez l'adulte.

La vaccination contre la coqueluche

La vaccination contre la coqueluche est obligatoire.

Elle se pratique la primovaccination à 2, 3 et 4 mois avec rappel à 16-18 mois.

Compte tenu du risque de contamination des très jeunes nourrissons par des adolescents ou de jeunes adultes, on recommande un rappel entre l'âge de 11 et 13 ans.

La vaccination est également recommandée :

- pour les personnels médicaux et para-médicaux prenant en charge les nourrissons de moins de 6 mois,
- pour les adultes susceptibles de devenir parents dans les mois ou années à venir.

Quels sont les symptômes qui font penser à une coqueluche?

C'est d'abord la toux qui est, au début, sèche, nocturne, accompagnée d'une petite fièvre. Puis apparaissent les quintes (dix à vingt secousses respiratoires, arrêt en expiration, puis reprise inspiratoire ample avec un bruit évoquant le «chant du coq»). La quinte va jusqu'à cinq mouvements de toux et l'émission d'un crachat clair et visqueux. Les râles bronchiques sont rares à l'examen du thorax.

Comment fait-on le diagnostic de la coqueluche?

On réalise une culture des sécrétions bronchiques. C'est la méthode de référence.

La sérologie a un intérêt limité au niveau individuel car elle ne permet qu'un diagnostic rétrospectif et tardif.

Quelles sont les principales causes et conséquences de la coqueluche?

1. Principales causes

Cette maladie infectieuse est due au bacille de Bordet et Gengou.

2. Evolution

Tout disparaît en quelques jours.

3. Conséquences éventuelles

Quelquefois, la toux peut réapparaître à l'occasion d'une infection bronchique banale : c'est le «tic coqueluchoïde».

Les complications bronchiques de type «dilatations des bronches» sont devenues très rares aujourd'hui.

Quel est le traitement de la coqueluche?

On procède à :

- isolement du malade (pas d'école pendant 30 jours à partir du début de la maladie),
- information de l'entourage sur les risques de contamination des enfants non encore vaccinés,
- antibiothérapie adaptée pour toute toux suspecte de coqueluche,
- antibio-prophylaxie des sujets contacts pendant 10 jours.

Vous avez une question ? Vous souhaitez faire un commentaire ? info@respir.com

Base documentaire et formation en pneumologie
<http://www.respir.com>

